

San Buenaventura Urologia
en asociacion con Memorial de comunidad sistema de salud
MARC A. BEAGHLER, M.D. • SEYED M. KHODDAMI, M.D.
2705 Loma Vista Rd., Suite 206 • Ventura, CA 93003
• telefono: 805-643-4067 • Fax: 805-648-5612
Urologia adulto y pediatrica

INSTRUCCIONES DE BRAQUITERAPIA POSTOPERATORIA

Dieta: Reanudar su dieta normal (a menos que se indique lo contrario).

Actividad: Evitar levantar objetos pesados o actividades extenuantes durante los primeros 2 dias. Despues de eso, usted puede volver a su nivel normal de actividad.

Efectos secundarios: Se espera que leve malestar o una sensacion de ardor. Tomar Tylenol o Advil para cualquier malestar. Usted puede utilizar OTC Azo o Cystex Plus. Puede experimentar los sintomas de frecuencia urinaria, urgencia, chorro urinario debil, dificultad para empezar a la corriente urinaria, ardor al orinar o sangre en la orina y las heces. Por favor consulte a su medico si usted tiene una fiebre mayor de **101 grados F**.

SEGURIDAD RADIOLOGICA:

- Seguridad es una preocupacion para muchos de nuestros pacientes. Los isotopos radiactivos (Yodo-125 y 131 cesio) se colocan permanentemente y como todo radiactivo materiales, las emisiones de rayos gamma de las semillas disminuyen con el tiempo.
- Cualquier mujer embarazada o posiblemente embarazada debe evitar el contacto cercano prolongado con usted durante los primeros 2 meses despues de la semilla de la radiacion del implante. Ella no debe abrazarte o sentarse muy cerca de usted. Ella puede te saludan brevemente y luego pasar a un distancia de 6 pies o mas lejos.
- Ninos/bebes no deben sentarse en su regazo para los primeros 2 meses. Tras el implante de semillas de la radiacion. Conyuge de un paciente puede dormir en la misma cama si no hay riesgo de embarazo.
- Relaciones sexuales con condon podra reanudarse dos semanas despues del implante. El semen puede decolorarse (rojo, marron o negro). Esto es normal y no es un motivo de preocupacion. Despues de 2 meses, no sera necesario usar un condon.
- Relaciones sexuales con condon podra reanudarse dos semanas despues del implante. El semen puede decolorarse (rojo, marron o negro). Esto es normal y no es un motivo de preocupacion. Despues de 2 meses, no sera necesario usar un condon.

Si encuentras una pequeña semilla de metal en la orina, lave el inodoro 3 veces y recuerde informar a su médico. Si encuentras una pequeña semilla de metal en su cama, recoger con pinzas y colocarlos en el inodoro. Descarga el inodoro 3 veces y no olvide informar a su médico.

Por favor llame a la oficina con sus preguntas o duda.