


San Buenaventura Urologia
en asociacion con Memorial de comunidad sistema de salud
MARC A. BEAGHLER, M.D. • SEYED M. KHODDAMI, M.D.
2705 Loma Vista Rd., Suite 206 • Ventura, CA 93003
• telefono: 805-643-4067 • Fax: 805-648-5612
Urologia adulto y pediatrica

LA CIRCUNCISION



LA CIRCUNCISION

Instrucciones Generales Postoperatorias de la Circuncision

- Se puede duchar 24 horas despues de la cirugi'a una vez se han quitado las vendas. Las suturas se disolveran con el tiempo y no necesitan ser retiradas. Seque el area de la incision cuidadosamente, en lugar de frotar.
- Limpie la punta del pene diariamente en la ducha, retire el prepucio para' mirar las suturas y aplique unguento Neosporin.
- Puede nadar o tomar un bano de tina una semana despues de la cirugia.
- No levante mas de 10 libras durante dos semanas.
- Usted debe ser capaz de reanudar el ejercicio dos semanas despues de la cirugia. Si la incomodidad devuelve entonces reduce la actividad, tomelo con calma y mas gradualmente reanuda sus actividades.
- Ningunas relaciones sexuales durante 6 semanas.
- Espere sangrar un poco de su incision durante la siguiente una semana, si esto empeora entonces por favor Name a su medico.
- Si usted desarrolla fiebre o escalofrios, tome su temperatura durante el episodio con un termometro oral, si es mayor de 100.5 F. entonces por favor llame a su medico.
- Si nota el pus que viene de alguna herida, por favor llame a su medico.
- En caso de emergencia, por favor visite su sala de emergencia mas cercana para evaluacion.

Instrucciones Especificas Postoperatorias de la Circuncision

- Use ropa ligera (como los calzoncillos boxer, shorts de gimnasio o sudaderas) durante las proximas dos semanas o hasta que se disuelva el material de sutura. Esto disminuira su malestar con la actividad.
- Use unguento Bacitracin o Neosporin (en los medicatmentos sin receta en cualquier farmacia local) 3 veces al di'a e inspeccione las suturas retirando el prepucio para mirar las suturas.